

Laparoskopinė splenektomija dėl didelės blužnies cistos

Marius Paškonis, Mindaugas Kvietkauskas, Tadas Ivanauskas, Kęstutis Strupas
Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas, Vilnius, Lietuva

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, abdominalinės chirurgijos centras,
Vilnius, Lietuva

Pristatome klinikinį atvejį: 27 metų vyras tirtas ambulatoriškai dėl užsitęsusio subferilaus karščiavimo, bendrų negalavimų. Skundai tęsėsi apie 4 mėnesius. BKT, CRB nukrypimų nuo normos nenustatyta. Atlikus pilvo organų UG tyrimą stebima blužnies cista, 10 x 12 cm dydžio. Ištyrus pilvą KT, nustatyta, kad cista spaudžia ir pastumia skrandžio kūną, deformuoja jo užpakalinę sieną, spaudžia ir nustumia kasos uodegą, spaudžia kair. antinksį. Laparoskopškai apžiūrėjus pilvo ertmę ir vertinant makroskopinius pakitimus cistos sienelėje bei išreiktą perispleninių audinių reakciją, nuspręsta atlikti laparoskopinę splenektomiją neatveriant cistinio turinio.