

## Laparoskopinė IPOM plius hernioplastika buvusios stomos vietoje po Hartmano procedūros ir jos reversijos

Tadas Ivanauskas, Donatas Danys, Mindaugas Kvietkauskas, Vytautas Lipnickas,  
Tomas Poškus, Kęstutis Strupas

Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas, Vilnius, Lietuva

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, abdominalinės chirurgijos centras,  
Vilnius, Lietuva

Pristatome klinikinį atvejį: 62 metų moteris patyrė jatrogeninę storosios žarnos perforaciją kolonoskopinės polipektomijos metu. Ekstrine tvarka atlikome laparoskopinę Hartmano procedūrą, o po 6 mėnesių – laparoskopinę kolostomos reversiją. Praėjus 4 mėnesiams, pacientė sugrįžo su buvusios stomos vietoje pasireiškusia pooperacine išvarža (defekto dydis – 3 x 1,5 cm). Nuspręsta toliau tęsti gydymą naudojant laparoskopinę techniką. Taigi, šiame video montaže demonstruojame laparoskopinę IPOM plius hernioplastiką buvusios stomos vietoje po Hartmano procedūros ir jos reversijos.

Šis atvejis išryškina laparoskopinio metodo pranašumus gydant stomos vietoje pasireiškiančias pooperacines išvaržas. Laparoskopinė IPOM plius technika yra saugi ir patikima, užtikrina greitą sveikimą po operacijos ir sumažina pooperacinį skausmą. Pasiekiami puikūs kosmetiniai rezultatai.